

# Chemotherapie des Magenkarzinoms in onkologischen Schwerpunktpraxen

V. Lakner<sup>1</sup> für die PIO-Gruppe<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Onkologische Schwerpunktpraxis Rostock, <sup>2</sup>Projektgruppe internistische Onkologie

## Fragestellung:

Laut interdisziplinärer Leitlinien 2002 ist die Indikation zur Chemotherapie bei einem Magenkarzinom mit Fernmetastasen oder nach einer R2-Resektion gegeben.

Ziel der Erfassung von Behandlungsdaten ist die Einhaltung von Therapie- und Qualitätsstandards im Praxisalltag.

## Methoden:

Im Rahmen eines Qualitätssicherungsprojektes wurden seit März 2004 Patienten, die eine Chemotherapie bei lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Magenkarzinomen erhielten, erfasst. Von 654 gemeldeten Patienten sind 367 dokumentiert und ausgewertet. 62 onkologische Schwerpunktpraxen sind beteiligt.

## Ergebnisse:

Von 367 Patienten erhielten 19 eine präoperative, 14 eine adjuvante und 334 eine palliative First-Line Chemotherapie. Letztere werden nachfolgend beschrieben.

Patientencharakteristik: 218 (65%) männlich, 116 (35%) weiblich; AZ 2 (1-4) nach ECOG.

Das mediane Alter bei Therapiebeginn lag bei 65 Jahren (22-86 Jahre). 45 (13%) Patienten hatten einen Gewichtsverlust vor Therapiebeginn von mehr als 10 kg, 102 (30%) zwischen 5-10 kg und 81 (24%) von weniger als 5 kg. Weitere Symptome waren: 109 (33%) Schmerzen, 53 (16%) Fatigue, 37 (11%) Anorexie. Bei 36 (11%) Patienten lag eine lokal fortgeschrittene, bei 298 (89%) eine rezidierte bzw. metastasierte Erkrankung vor. 239 (72%) Patienten hatten bereits bei der Erstdiagnose ein primär metastasiertes Karzinom.

Nur 15 Patienten waren mit einer präoperativen bzw. adjuvanten Chemo- bzw. Strahlen-/Chemotherapie vorbehandelt.

Folgende Therapien wurden verabreicht: 224 (67%) FLP, 38 (11%) AIO, 25 (7%) Irinotecan/AIO, 24 (7%) Mitomycin/AIO, 7 ECX, 7 EOX, 5 DCF, 1 ECF, 1 FLO. Die mediane Therapiedauer lag bei 125 Tagen (1-700), die Remissionsrate bei 32% (24 CR, 84 PR, 129 NC, 54 PD, 43 nb), die mediane Remissionsdauer einer CR bei 298 Tagen, die einer PR bei 164 Tagen.

Bis zum Zeitpunkt der Auswertung bekamen 148 (44%) Patienten eine weitere 2nd-line, 38 (11%) 3rd-line, 10 (3%) 4th-line und 2 (1%) eine 5th-line-Therapie.

250 Patienten sind bisher verstorben. Das mediane Überleben ab Therapiebeginn liegt bei 11 Monaten.

## Schlussfolgerungen:

Die Erfassung der eingesetzten Therapiemodalitäten wird insbesondere hinsichtlich neuer innovativer Regime und Therapiestrategien fortgesetzt. Aktuelle Ergebnisse werden publiziert.